

Ксельянз — Xeljanz (Тофацитиниб яквинус)

Тяжелая и умеренная степень тяжести ревматоидного артрита у пациентов взрослого возраста.

Ксельянз – это лекарственное средство, которое входит в категорию селективных иммунодепрессантов. Подобные вещества искусственным путем вызывают угнетение иммунитета. Они применяются при терапии заболеваний иммунной системы. Препарат **Ксельянз (Tofacitinib) - Xeljanz (Tofacitinib) - Яквинус купить** который можно на нашем сайте, предназначен для борьбы с ревматоидным артритом, которые не поддается терапии с использованием стандартных противовоспалительных препаратов.

Показания к применению

Тяжелая и умеренная степень тяжести ревматоидного артрита у пациентов взрослого возраста.

Противопоказания

Ксельянз (Tofacitinib) - Xeljanz (Tofacitinib) - Яквинус не назначается следующим группам пациентам:

- гиперчувствительность к входящим в состав препарата компонентам;
- наличие гепатита С или В;
- обострившиеся инфекционные болезни;
- лактазная недостаточность;
- тяжелые заболевания печени;
- аллергия на молочный сахар;
- запрещается проводить терапию во время применения живых вакцин.

Способ применения

Собираясь приобрести лекарство, следует учитывать, что на средство **Ксельянз (Tofacitinib) - Xeljanz (Tofacitinib) - Яквинус** цена может изменяться, поэтому нужно уточнять ее, позвонив по телефону нашему специалисту. Форма выпуска препарата – таблетки, которые предназначены для перорального приема. Средство принимается вне зависимости от времени употребления пищи. Стандартная дозировка составляет 10 мг в сутки, ее необходимо разделить на два раза. В некоторых ситуациях дозу увеличивают до 20 мг. Лечение прекращают, если результаты, полученные в ходе лабораторных исследований, показывают, что уровень гемоглобина в крови у больного опустился ниже значений 90 г/л, а уровень нейтрофилов ниже $1,0 \cdot 10^9/\text{л}$.

Побочные действия

Возможно появление негативных реакций со стороны организма при приеме препарата **Ксельянз (Tofacitinib) - Xeljanz (Tofacitinib) - Яквинус** **отзывы пациентов** говорят о том, что это не случается нечасто, но все же могут возникнуть следующие явления:

- инфекционные болезни (герпес, пневмония, нозофарингит);
- диарея;
- головная боль;
- повышение артериального давления;
- тошнота и рвота;
- бессонница;
- понижение уровня компонентов крови;
- кашель, одышка;
- отечность ног;
- аллергическая реакция;
- вялость и повышение температуры тела.