

Левакт (Ливакт) — Levact (Бендамустин)

- хронический лимфолейкоз (рак лейкоцитов, называемых лимфоцитами) у пациентов, которым лечение флударабином (другим противораковым препаратом) не подходит;
- неходжкинская лимфома (рак лимфатической ткани, части иммунной системы) у пациентов, у которых рак ухудшился во время или после лечения, содержащего ритуксимаб (другое противоопухолевое лекарство);

Левакт — противораковое лекарство. Применяется для лечения следующих видов рака:

- хронический лимфолейкоз (рак лейкоцитов, называемых лимфоцитами) у пациентов, которым лечение флударабином (другим противораковым препаратом) не подходит;
- неходжкинская лимфома (рак лимфатической ткани, части иммунной системы) у пациентов, у которых рак ухудшился во время или после лечения, содержащего ритуксимаб (другое противоопухолевое лекарство);
- множественная миелома (рак костного мозга) в сочетании с преднизолоном у пациентов старше 65 лет, которые не подходят для трансплантации стволовых клеток и не могут лечиться талидомидом или бортезомибом (другими противораковыми препаратами).

Активное вещество в Levact, бендамустина гидрохлорид, принадлежит к группе противораковых лекарств, называемых «алкилирующими агентами». Он связывается с ДНК клеток во время их размножения, что останавливает деление клеток. В результате раковые клетки не могут делиться, и рост опухолей замедляется.

Бендамустин используется в противоопухолевых препаратах в Германии с

начала 1970-х годов.