Зеджула — Zejula (Нирапариб)

- рак брюшины (первичный);
- онкологическое изменение маточных труб;
- серозная карцинома яичников (рецидивирующая).

Препарат Зеджула Нирапариб это новое противораковое средство в пероральной форме (капсулах).

Действующее вещество нирапариб блокирует работу PARP-белка, содействует восстановлению ДНК, контролирует энергетический обмен и клеточный цикл. Зеджула губительно влияет на опухолевые клетки с генами мутации BRCA1 и BRCA2. Активное вещество быстро всасывается и определяется в крови спустя 30 минут после употребления дозы лекарственного препарата. Пик концентрации препарата наступает через 3 часа.

Показания

Препарат осуществляет лечение взрослых пациентов с диагнозами:

- рак брюшины (первичный);
- онкологическое изменение маточных труб;
- серозная карцинома яичников (рецидивирующая).

Противопоказания

Препарат противопоказан при наличии:

- сердечных патологий;
- повышенного АД;
- беременности;
- аллергии на компоненты лекарства.

Вероятные побочные эффекты

Лечение данным препаратом может вызывать:

- тошноту/рвоту;
- лихорадку/озноб;
- аритмию/значительное увеличение АД;
- болезненное мочеиспускание;
- диспепсию;
- одышку;
- ринофарингит;
- головокружение;
- тромбоцитопению;
- миелодиспластический синдром.

Для обеспечения максимально безопасного лечения нужно соблюдать инструкции доктора. Перед покупкой препарата следует изучить побочные эффекты. Уточнить у своего доктора при каких симптомах срочно требуется медицинская помощь.

Специфика приема

1. У пациентов, использующих в лечении данный препарат, были выявлены побочные гематологические реакции, иногда это служило поводом для прекращения терапии.
2. Возобновление приёма Зеджула начинают после восстановления организма от гематологической токсичности после химиотерапии. Первый месяц еженедельно контролируются показатели крови. Следующие 11 месяцев контроль осуществляется ежемесячно. Также весь первый год ежемесячно наблюдают за АД и сердечными сокращениями. Проводят корректирование дозы препарата для контроля гипертонии.

Хранение препарата

Нирапариб хранится при температуре не выше +25 градусов. Лекарство следует использовать в течении 2 лет. Не использовать по истечению срока годности по причине того, что возможны нежелательные реакции или

нужный эффект лечения не будет достигнут.

Заказать препарат вы можете прямо сейчас с большей выгодой для своего бюджета, чем в других аптеках и фирмах. Совершить покупку у нас стоит и по причине того, что продаваемые нами лекарственные средства сертифицированы и безопасны, также для вашего удобства доступна доставка по Казахстану.